

Augmentation mammaire

Opération: Augmentation de la taille et du galbe des seins par implantation de prothèses en silicone ou remplies de sérum physiologique ou encore d'hydrogel soit au-dessus soit au-dessous de la musculature du thorax dans un but esthétique.

Durée: Environ 2 heures.

Anesthésie: Anesthésie générale ou anesthésie locale combinée à une sédation intraveineuse.

Hospitalisation/ambulatoire: Les deux sont possibles en fonction de la préférence de la patiente et du chirurgien.

Effets secondaires possibles: Inconfort temporaire, œdème, diminution plus ou moins importante de la sensibilité du mamelon, hématomes disparaissant progressivement. Les seins peuvent rester sensibles au toucher pour plusieurs semaines.

Risques potentiels: Les Implants mammaires doivent parfois être ôtés et/ou remplacés pour différentes raisons : dégonflement, rupture d'un implant, développement d'un tissu cicatriciel rétractile autour de l'implant (coque déformante) entraînant un durcissement d'un ou des deux seins, saignement, infection. Un autre risque est la diminution de la sensibilité de la peau du sein et du mamelon qui peut parfois être définitive.

Récupération: Selon les cas, le retour au travail peut se faire déjà après quelques jours (7 à 10 jours). Les chocs directs sur la poitrine doivent être évités pour 3 à 4 semaines. Les cicatrices s'estompent plus ou moins selon les patients entre 3 mois et 2 ans postopératoires.

Résultats: Le résultat varie d'une patiente à l'autre. On obtient une augmentation de la taille des seins en améliorant leur apparence.